



## COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN BUCUREȘTI

București, str. Armenească nr. 21A, sector 2, cod 021042

Tel.: 0723232780 ; 0722638448 ; tel./fax: 0213171344;

E-mail: [office@cfbucuresti.ro](mailto:office@cfbucuresti.ro); web: [www.cfbucuresti.ro](http://www.cfbucuresti.ro)

### COMUNICAT

În contextul temerii legate de o eventuală creștere a nivelului de radiații din cauza bombardamentelor din Ucraina, numărul de solicitări de preparate cu iod (iodură de potasiu) este foarte mare.

În eventualitatea producerii unui accident nuclear, administrarea iodului are ca scop saturarea tiroidei, pentru a împiedica ulterior captarea de către aceasta a iodului radioactiv.

Produsele cu iodură de potasiu din Nomenclatorul ANMDMR, toate cu regim de eliberare pe bază de prescripție care se reține în farmacie (PRF), sunt:

- Jodid cpr. 100 micrograme Merck
- Iodură de potasiu ATB cpr. 65 mg Antibiotice Iași
- Iodură de potasiu G.L. Pharma cpr. 65 mg.

*ATENȚIE! Iodura de potasiu substanță, utilizată la receptură, nu poate face excepție de la acest mod de eliberare, deși nu are reglementări clare în această privință.*

Dorim să vă menționăm câteva aspecte din RCP-ul comprimatelor de 65 mg:

- **Indicație: tratamentul profilactic al efectelor iodului radioactiv** asupra glandei tiroide în cazul eliberării de iod radioactiv în aer, **în urma unui accident nuclear.**

**Acest medicament trebuie administrat numai sub controlul autorităților competente.**

- **Reacții adverse – dereglări grave ale funcționării glandei tiroide: hipertiroidism, boli autoimune (Graves și Hashimoto), gușă nodulară toxică și hipotiroidism indus de iod. De asemenea, s-au raportat hiperactivitate tiroidiană, tiroidită, mărirea glandei tiroide cu sau fără dezvoltarea mixedemului** (RCP Iodură de potasiu ATB).

**În concluzie, este strict contraindicat tratamentul profilactic cu iod în absența unui accident nuclear!**

Președinte CFB

Prof.dr.farm. Simona Negreș

*Simona Negreș*

